

Хламидиоз

как защитить себя и близких

Хламидиоз –
инфекционное заболевание,
передающееся половым
путем, которое вызывается
бактериями *Chlamydia*
trachomatis (хламидиями).



Является одним из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Кроме мочеполовой системы инфекция может поражать слизистые оболочки других органов: глаз, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также суставы.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД  РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Пути заражения:



- половой – при любых формах незащищенных половых контактов с инфицированным партнером;
- вертикальный (от матери к ребенку) – заражение новорожденного во время родов при прохождении через инфицированные родовые пути;
- контактно-бытовой – в редких случаях возможно заражение через общие туалетные принадлежности (полотенце, мочалку, губку);
- в редких случаях девочки младшего возраста могут заразиться бытовым путем при нарушении правил личной гигиены.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ





8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Признаки заражения появляются
на 5-30 день после инфицирования
(в среднем на 10-14 день).

Однако больной не всегда
сразу замечает симптомы
и считает себя здоровым.

При ослаблении иммунитета
возможно активное размножение
хламидий и так называемое
«пробуждение» инфекции.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Симптомы хламидийной инфекции

- слизисто-гнойные выделения из половых путей;
- межменструальные кровянистые выделения;
- болезненность во время половых контактов;
- зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании;
- учащенное мочеиспускание;
- дискомфорт или боль в нижней части живота;
- боли в промежности с иррадиацией в прямую кишку.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ




8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Симптомы хламидийной инфекции

Хламидии также могут поражать и другие органы и системы:

- Поражение глаз (хламидийный конъюнктивит).
Симптомы: покраснение глаз и отечность пораженного глаза, скудные слизисто-гнойные выделения, отделяемые в углах пораженного глаза. В отсутствии лечения может развиваться слепота.
- Поражение суставов (реактивный хламидийный артрит).
При этом чаще поражаются крупные суставы (коленные, голеностопные, тазобедренные, межпозвоночные).
- При распространенной хламидийной инфекции могут развиваться фарингит, пневмония, перигепатит и перитонит.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Диагностика

Ключевую роль играют лабораторные методы диагностики – обнаружение ДНК хламидий.

Для исследования берут соскобы из разных мест, в зависимости от того, где локализуется инфекционный процесс и данных сексуального анамнеза.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗД  РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Лечение хламидиоза

Цель терапии – полностью устранить возбудителя из организма. Это предотвратит развитие осложнений и передачу инфекции половым партнерам.

Компоненты лечения:

- медикаментозная терапия назначается исключительно врачом-специалистом (гинекологом, урологом или венерологом);
- обязательное одновременное лечение всех половых партнеров (даже при бессимптомном течении инфекции);
- рекомендуется половое воздержание на весь период лечения;
- контроль эффективности лечения через 3-4 недели после окончания курса (повторно сдать анализы).



Осложнения хламидиоза

У женщин:

бесплодие, невынашивание беременности, внематочная беременность, хроническое воспалительное поражение органов малого таза.

У мужчин:

простатит, бесплодие и импотенция.

Кроме того, хламидийная инфекция может создавать серьезный риск для здоровья детей, рожденных от инфицированных матерей (наиболее часто проявляется поражением дыхательных путей (пневмония), инфекцией мочевых путей, задержкой развития и др.).



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Как защититься от инфекции?

- презервативы при надлежащем использовании являются одним из самых эффективных средств защиты;
- исключить случайные половые контакты;
- проходить обследование на ИППП при каждой смене полового партнера и после незащищенного полового акта, а также при наличии опасений по поводу возможного инфицирования/реинфицирования;
- при возникновении симптомов своевременно обращаться к специалисту;
- при беременности на фоне риска ИППП важно до рождения ребенка пройти обследование и лечение;
- повторное инфицирование возможно даже после лечения; для профилактики нужно убедиться в том, что половые партнеры прошли лечение.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Куда обратиться за медицинской помощью?

При подозрении на хламидийную инфекцию необходимо обратиться в поликлинику кожно-венерологического диспансера.

К какому специалисту?

Мужчинам обращаться к венерологу или урологу, а женщинам – к гинекологу или венерологу.

Можно ли вылечить самостоятельно дома?

Нет, для диагностики и лечения необходима консультация специалиста! Не стоит заниматься самолечением, а также лечением народными средствами.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU

