


Современный сифилис: как защитить себя и близких

Сифилис – это инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (*Treponema pallidum*).



Трепонема – это бактерия, которая проникает в организм человека через повреждения на слизистых оболочках и коже. Она быстро размножается и распространяется по кровеносной и лимфатической системам.

Без лечения болезнь прогрессирует и может поражать не только слизистые оболочки, кожу, но и нервную систему, внутренние органы и кости.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Как передается сифилис?

- Половым путем (вагинальный, оральный или анальный секс).
- Через кровь (при переливании, использовании нестерильных шприцев).
- От матери к ребенку (во время беременности, родов или грудном вскармливании).
- Бытовым путем (редко, через общие предметы гигиены при наличии язв у больного).



Не передается: через туалеты, бассейны, посуду, одежду!



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ




8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Стадии сифилиса

Первичный сифилис:

- Инкубационный период начинается с внедрения трепонемы и заканчивается появлением шанкра. Продолжительность периода от 2 недель до 2 месяцев.
- Безболезненная язва (шанкр) в месте проникновения трепонемы (половые органы, прямая кишка, рот). Увеличение лимфатических узлов.
- Шанкр заживает без лечения через 3-6 недель, но инфекция прогрессирует.



Вторичный сифилис:

- Высыпания на коже и слизистых оболочках, повышение температуры тела, головная боль, утомляемость, боль в горле, выпадение волос.
- Высокая заразность. Без лечения, наступает стадия позднего сифилиса.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ




8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Стадии сифилиса

Поздняя (скрытая) стадия:

- Начинается через 1-2 года после заражения. Без лечения больные остаются носителями заболевания, даже если у них нет проявлений.
- Поражаются головной мозг, нервы, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень. Поражения могут начаться через много лет после заражения.
- Нарушение координации, паралич, слепота и слабоумие. Проявления чаще всего неизлечимы и приводят к смерти.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU




Врожденный сифилис

Если беременная женщина больна сифилисом, это может вызвать серьезные изменения у ее ребенка:

- деформация костей;
- слепота;
- глухота;
- задержка развития;
- поражение внутренних органов.

В 25 % случаев регистрируется мертворождение («замершая беременность»), в 30 % – смерть новорожденного сразу после родов.

Важно! Все беременные женщины обследуются на сифилис.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ




8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Профилактика сифилиса:

- Регулярное обследование – проверяйтесь на сифилис при частой смене половых партнеров.
- Безопасные отношения – наличие одного здорового полового партнера.
- Презервативы – латексные снижают риск, но со смазкой – неэффективны (повреждают слизистые).
- Отказ от алкоголя/наркотиков – снижает риск небезопасного секса.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Диагностика сифилиса

Проводится исследование крови на антитела против бледной трепонемы.

В крови зараженного человека обнаруживается высокий титр антител против трепонемы, но не ранее чем через 1-4 недели после появления шанкра.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



Лечение сифилиса

- Легко излечим на ранних стадиях.
- Антибиотики убивают трепонему и предотвращают осложнения.
- Важно пройти полный курс антибиотикотерапии без прерывания с контролем анализов после лечения.
- В первый год после лечения проводится динамическое наблюдение за состоянием пациента и титрами антител на трепонему каждые 3 месяца, затем – каждые 6 месяцев.



Запрещается:

- самолечение;
- использование народных методов!



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



Важно знать!

- При обнаружении сифилиса необходимо проинформировать об этом полового партнера с целью выявления у него наличия заболевания и полного лечения.
- Без лабораторных тестов половые партнеры не могут быть уверены в здоровье друг друга.
- Во время лечения необходимо избегать половых контактов пока шанкры и другие кожные повреждения полностью не заживут.
- Излечившиеся от сифилиса не защищены от повторного заражения.
- Передача сифилиса не может быть предотвращена мытьем половых органов, мочеиспусканием или принятием душа после секса.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU

